



СТОЛБНЯК

Острое заболевание с поражением нервной системы.

Возбудитель – анаэробная бактерия - столбнячная палочка.

Путь передачи: контактный. Болезнь развивается при попадании в рану, порез или ссадину столбнячной палочки, находящейся в почве, которая является частым и безвредным обитателем кишечника человека многих домашних и диких животных. Попадая в благоприятную среду (рана, поврежденная кожа) она активируется и начинает быстро размножаться.

Инкубационный период: От 3 до 21 дня.

Клиническая картина. Болезнь может начинаться с судорог мышц челюсти, возникают проблемы с глотанием. В дальнейшем, по мере накопления токсинов столбнячной палочки и попадания их в центральную нервную систему, возникает напряжение мышц шеи, живота, конечностей. Появляются судороги. Внешние раздражители могут провоцировать генерализованные судороги. Этот процесс очень опасен для жизни.

Лечение: иммунный столбнячный глобулин, антибиотикотерапия.

Осложнения: тромбоэмболия лёгочной артерии; переломы костей, разрывы мышц, остановка сердца

Профилактика. 1-я вакцинация ребенка проводится в 3 мес., 2-я - в 4,5 мес., 3-я - в 6 мес.; 1-я ревакцинация в 18 мес., 2-я - в 6 лет, 3-я – в 14 лет, в соответствии с Национальным календарем прививок.

С профилактической целью важно своевременно проводить обработку ран, порезов, ссадин и ожогов и обращаться за медицинской помощью при травмах, которые сопровождаются повреждением кожных покровов.

Экстренно проводится специфическая профилактика столбнячным анатоксином.

